



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation GENERAL

- Peau très brillante et attractive
- Potentiel de rendement très élevé
- Peut être utilisée en deuxième culture (automne/hiver)
- Bon profil agronomique
- Bonne aptitude à une longue conservation

Caractéristiques agronomiques

Maturité	64	Demi-tardive
Période de dormance	78	Longue
Rendement à maturité	119	Très élevé
Calibre	83	Gros
Forme		Oblong court / Oblong
Nombre de tubercules		9-11
Couleur de peau		Jaune clair
Chair après cuisson		Crème
Type de cuisson		B - Légèrement farineux
Matière sèche/Amidon %		18,5% / 12,7%
Poids sous l'eau/		336 / 1,071
Noircissement interne	8	Peu sensible
Sens. à la Métribuzine	63	● ● ● ● ●
Boulage	86	● ● ● ● ●



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

Densité du peuplement

Objectif commercial: + 50 mm.

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs	
		75 cm	90 cm
28/35	35 000	38	32
35/45	36 000	37	31
45/55	34 000	39	33
35/55	34 000	39	33
55/65	32.500	41	34

Profondeur de plantation: normale.

Toujours vérifier le nombre de tubercules/kg pour une densité de plantation plus précise.

Résistances

Mildiou du feuillage	50	● ● ● ● ●
Mildiou du tubercule	69	● ● ● ● ●
Alternaria	71	● ● ● ● ●
Gale commune	61	● ● ● ● ●
Gale poudreuse	68	● ● ● ● ●
Virus rattle du tabac	84	● ● ● ● ●
Virus Y	99	● ● ● ● ●
Yntn virus sur tubercule	99	● ● ● ● ●

Nématodes

Ro1/4 *9	● ● ● ● ●
Ro2/3 *9	● ● ● ● ●
Ro5	● ● ● ● ●
Pa2 *3	● ● ● ● ●
Pa3	● ● ● ● ●

Galle Verruqueuse

F1 *9	● ● ● ● ●
F2	● ● ● ● ●
F6 *5	● ● ● ● ●
F18	● ● ● ● ●

* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

Fertilisation

- Adapter la fertilisation selon l'analyse de sol.
- Toujours se référer aux conditions légales en vigueur dans votre région.
- Azote (N): Besoins moyens (170-210 kg N/ha, reliquats inclus).
- Potassium (K): environ 250 kg K/ha avant plantation. Dans les sols pauvres en potassium, apporter en complément 100 kg/ha après la tubérisation.
- Engrais phosphaté (P): environ 90-100 kg P/ha avant plantation.
- Pour une meilleure conservation, inclure du calcium et du bore dans la fertilisation.



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation GENERAL



Plantation

- TAYCAN présente une longue dormance.
- Bien réchauffer les plants. Planter au stade point blanc.
- Réchauffement de deux semaines minimum.
- Toujours traiter les plants de TAYCAN contre le rhizoctone.




Culture

- TAYCAN est assez sensible à la métribuzine, traiter uniquement en pré-levée.
- Maintenir une bonne humidité du sol pour assurer rendement et qualité.
- Utiliser un programme efficace pour prévenir le mildiou du feuillage.



Défanage et Récolte

- Seule une culture arrivée à maturité donnera un produit stockable.
- Respecter un délai défanage - récolte de 2 semaines minimum.
- Récolter uniquement quand les conditions optimales sont réunies.



Conservation

- Avec une gestion correcte du stockage, TAYCAN présente une bonne aptitude à la longue conservation.
- Température de stockage : 5 °C.
- TAYCAN a une longue dormance. L'emploi d'inhibiteurs de germination n'est nécessaire que pour la fin de campagne.