



GENERAL

- **Buccia lucente, molto invitante**
- **Alta resa**
- **Idonea per la produzione bisestile**
- **Buona resistenza al confezionamento**
- **Idonea per una lunga conservazione**

Caratteristiche agronomiche

Maturazione	64	Medio-tardiva
Durata della dormienza	78	Lunga
Resa	119	Molto alta
Calibro del tubero	83	Grosso
Forma del tubero		Tonda-ovale / Ovale
Numero di tuberi		9-11
Colore della pelle		Giallo-chiara
Colore pasta cottura		Crema
Tipo di cottura		B - Quasi farinosa
Sostanza secca/Amido		18,5% / 12,7%
Contenuto de sostanza se		336 / 1,071
Inbrunimento interno	8	Qualcosa sensibile
Sens. al Metribuzin	63	● ● ● ● ●
Tuberomania	86	● ● ● ● ●



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

Densità di semina

Mercato: 50+ mm.

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila	
		75 cm	90 cm
28/35	35.000	38	32
35/45	36.000	37	31
45/55	34.000	39	33
35/55	34.000	39	33
55/65	32.500	41	34

Profondità di semina: normale.

Controllare sempre il numero di tuberi per un calcolo accurato.

Resistenze

Peronospora fogliame	50	● ● ● ● ●
Peronospora del tubero	69	● ● ● ● ●
Alternaria	71	● ● ● ● ●
Scabbia comune	61	● ● ● ● ●
Scabbia polverulenta	68	● ● ● ● ●
Macchie intern.nematodi	84	● ● ● ● ●
PVY	99	● ● ● ● ●
Yntn tolleranza tubero	99	● ● ● ● ●

Res. a nematodi

Ro1/4 *9	● ● ● ● ●
Ro2/3 *9	● ● ● ● ●
Ro5	● ● ● ● ●
Pa2 *3	● ● ● ● ●
Pa3	● ● ● ● ●

Res. a Rogna Nera

F1 *9	● ● ● ● ●
F2	● ● ● ● ●
F6 *5	● ● ● ● ●
F18	● ● ● ● ●

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

Concimazione

- Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno.
- Fare sempre riferimento alle norme locali vigenti in materia di fertilizzazione delle colture.
- Azoto (N): Bisogni medi (170-210 kg N/ha inclusa la dotazione del terreno).
- Potassio (K): circa 200 kg K/ha prima della semina. Nei terreni con scarsa dotazione di potassio, somministrare 100 unità dopo la tuberizzazione.
- Fosfato (P): circa 90-100 kg K/ha prima della semina.
- Al fine di ottenere una migliore conservazione dei tuberi, è consigliata la somministrazione di Calcio e Boro con la concimazione.



GENERAL



Preparazione dei tuberi e semina

- TAYCAN ha una lunga dormienza.
- Bene riscaldare il seme. Seminare con un piccolo germoglio bianco.
- Trattamento termico: minimo 2 settimane.
- Trattare sempre il seme contro la Rhizoctonia.




Coltivazione

- TAYCAN è abbastanza sensibile al metribuzin, usarlo solo in pre-emergenza.
- Mantenere un adeguato livello di umidità del suolo per ottenere un prodotto di qualità.
- Attuare un'accurata protezione contro la Phytophthora, per prevenire danni al fogliame.



Maturazione e raccolta

- Solo un raccolto maturo darà un buon prodotto conservabile.
- In caso di disseccamento del fogliame, attendere almeno due settimane prima della raccolta.
- Effettuare la raccolta solo quando le condizioni del suolo sono ottimali.



Conservazione

- Con una gestione adeguata del stoccaggio, TAYCAN è adatta per una lunga conservazione.
- Temperatura di conservazione: 5 °C.
- TAYCAN ha una lunga dormienza. L'inibitore della germogliazione si rende necessario solo per le spedizioni veramente tardive.