TIGER

INNOVATOR X CRISPS4ALL

Anbauempfehlung Speisekartoffeln FRENCH FRIES

- **Gleichmäßige Sortierung und Knollenform**
- **Stabile und gute Backqualität**
- **Gleichmäßige stärkeverteilung**
- **Nematodenresistenz Ro1/4 und Pa3**

Sorteneigenschaften

Reifezeit	65	Mittelfrüh
Keimruhe	52	Ziemlich kurz
Ertrag	97	Gut
Sortierung	81	Großfallend
Knollenform		Oval / Langoval
Knollenzahl		12-14
Schalenfarbe		Braun = russet
Fleischfarbe kochen		Hellgelb
Kochtyp		B - Vorwiegend Mehlig
TS/Stärke %		21,2% / 15,3%
UWG/Spez. Gewicht		390 / 1,084
Blaufleckigkeit	9	Wenig empfindlich
Metribuzin Empf.	55	
Knöllchensucht	90	



Schalen und Fleischfarbe

Kochtyp

Reifezeit

Pflanzabstände

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand 75 cm	90 cm
28/35	50 000	27	22
35/45	38 000	35	29
35/50	36 000	37	31
45/50	34 000	39	33
50/60	32 000	42	35
50/60 geschnitten	40 000	33	28

Pflanztiefe: normal

Resistenz

Krautfäule	50	
Knollenfäule	63	
Alternaria	69	
Schorf	60	
Pulverschorf	74	
Eisenfleckigkeit	91	
Y-Virus	24	
Yntn Knollentoleranz	98	

Nematodenresist.

Ro1/4	9	F1	10	
Ro2/3	6	F2	*5	
Ro5	*8	F6	*1	
Pa2	7	F18	*1	
Pa3	8			

* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Eine geteilte Gabe wird für ein kräftiges Gewächs empfohlen. Dies führt zu einer groberen Sortierung.
- Stickstoff (N): Sehr hoher Bedarf (>250 kg N/Ha inklusive Bodenversorgung).
- Kaliumchlorid (KCl) mindestens 6 Wochen vor dem Pflanzen ausbringen, da spätere Gaben einen niedrigen Stärkegehalt verursachen können.
- Eine hohe Phosphorverfügbarkeit fördert die Entwicklung des Wurzelsystems.
- Kalium (K): ca. 250 kg K/ha vor dem Pflanzen. Bei Böden mit niedrigem Kaliumgehalt nach der Knollenbildung zusätzlich 100 kg K/ha ausbringen.
- TIGER ist anfällig für Mineralstoffmangel, deswegen mit Spurenelementen düngen.

Diese Information ist mit Sorgfalt erstellt worden. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werd 24 Jan 2025
www.hzpc.com

TIGER

INNOVATOR X CRISPS4ALL

Anbauempfehlung Speisekartoffeln FRENCH FRIES

Vorbereitung und Pflanzung

- TIGER hat eine kurze Keimruhe.
- Empfindlich für Keimbruch
- Nicht abkeimen, damit werden Auflaufprobleme verhindert.
- Die beste Qualität wird auf fruchtbaren und mittelschweren Lehmböden erreicht.
- Vorkeimung ist nicht notwendig, TIGER kann mit kleinen weißen Keimen gepflanzt werden.
- Nicht in kalte Böden pflanzen, um einen unregelmäßigen Auflauf zu verhindern.
- Keimbruch während des Pflanzens vermeiden.
- Auf empfindlichen Böden sollte, wenn möglich, eine Bodenbehandlung gegen Rhizoctonia durchgeführt werden.



Anbau

- TIGER ist empfindlich gegen Metribuzin, nur im Vorauflauf anwenden.
- Bei Trockenperioden wird Bewässerung empfohlen.
- TIGER ist anfällig für Altenaria. Die erste Behandlung während der Blütezeit durchführen.
- Die Krautfäulebehandlungen regelmäßig durchführen, um Kraut- und Knollenfäule vorzubeugen.

Krautregulierung und Ernte

- Beugen Sie mechanischen Beschädigungen vor, um die Lagerfähigkeit zu verbessern.
- Die Knollen sind großfallend. Vorsichtig ernten und lagern, um Beschädigungen und Blaufleckigkeit zu vermeiden.



Lagerung

- Auf Grund der kurzen Keimruhe sollte besonders auf die Lagerung geachtet werden.
- TIGER ist gut lagerfähig, auch über einen längeren Zeitraum.
- Gute Wundheilung ist wichtig.
- Bei einer stabilen Temperatur von 7 °C lagern.
- Regelmäßig aber kurz lüften, um eine CO2-Anhäufung zu vermeiden.
- Die höchste Dosis an Keimhemmungsmitteln bei der ersten Anwendung verwenden.

Diese Information ist mit Sorgfalt erstellt worden. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werd 24 Jan 2025
www.hzpc.com