



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation France

- Tubercules de gros calibre
- Excellent goût
- Bon potentiel de rendement
- Tubercules réguliers en forme et calibre
- Excellente aptitude à la friture



Caractéristiques agronomiques

Maturité	65	Demi-hâtive
Période de dormance	52	Moyennement courte
Rendement à maturité	97	Moyen
Calibre	81	Gros
Forme		Oblong / Oblong allongé
Nombre de tubercules		12-14
Couleur de peau		Brun
Chair après cuisson		Jaune clair
Type de cuisson		B - Légèrement farineux
Matière sèche/Amidon %		21,2% / 15,3%
Poids sous l'eau/		390 / 1,084
Noircissement interne	9	Peu sensible
Sens. à la Métribuzine	55	● ● ● ● ●
Boulage	90	● ● ● ● ●



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

Densité du peuplement

Objectif commercial: 40-70 mm.

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs	
		75 cm	90 cm
28/35	50 000	27	22
35/45	38 000	35	29
35/50	36 000	37	31
45/50	34 000	39	33
50/60	32 000	42	35

Profondeur de plantation: normale.

Toujours vérifier le nombre de tubercules/kg pour une densité de plantation plus précise.

Résistances

Mildiou du feuillage	50	● ● ● ● ●
Mildiou du tubercule	63	● ● ● ● ●
Alternaria	69	● ● ● ● ●
Gale commune	60	● ● ● ● ●
Gale poudreuse	74	● ● ● ● ●
Virus rattle du tabac	91	● ● ● ● ●
Virus Y	24	● ● ● ● ●
Yntn virus sur tubercule	98	● ● ● ● ●

Nématodes

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	6	● ● ● ● ●
Ro5	*8	● ● ● ● ●
Pa2	7	● ● ● ● ●
Pa3	8	● ● ● ● ●

Galle Verruqueuse

F1	10	● ● ● ● ●
F2	*5	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

Fertilisation

- Toujours se référer aux conditions légales en vigueur dans votre Région.
- Nous recommandons le fractionnement de l'azote pour conserver un feuillage vigoureux et obtenir ainsi de plus gros tubercules.
- Azote (N): Besoins très élevés (>250 kg N/ha, reliquats inclus).
- Une haute teneur en phosphore est recommandée afin d'encourager le développement du système racinaire.
- Potassium (K): environ 250 kg K/ha avant plantation. Dans les sols pauvres en potassium, apporter en complément 100 kg/ha après la tubérisation.
- Des apports de manganèse et de magnésium encourageront le développement d'un feuillage robuste et préviendront une sénescence



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation France



Plantation

- Bien réchauffer les plants. Planter au stade point blanc.
- Toujours traiter les plants de TIGER contre le rhizoctone.
- Planter en parcelles irriguées.




Culture

- TIGER est assez sensible à la métribuzine, traiter uniquement en pré-levée.
- Maintenir une bonne humidité du sol pour assurer rendement et qualité.
- TIGER est sensible à l'Alternaria. Commencer les traitements anti-alternaria au cours de la floraison.
- Utiliser un programme efficace pour prévenir le mildiou du feuillage.



Défanage et Récolte

- Respecter un délai défanage - récolte de 3 semaines minimum.
- Éviter les endommagements mécaniques pour améliorer la tenue en stockage des tubercules.
- Limiter la vitesse de récolte et la hauteur de chute, pour réduire les dommages mécaniques.
- Récolter uniquement quand les conditions optimales sont réunies.



Conservation

- Avec une gestion correcte du stockage, TIGER présente une bonne aptitude à la longue conservation.
- Etant donné une faible teneur en sucre et une augmentation lente au cours du temps, TIGER peut être stockée à basses températures.
- Respecter la période de cicatrisation.
- Abaisser rapidement la température après récolte pour atteindre 5°C. Conservation optimum jusque avril-mai.
- Stabiliser la température à 5 °C en la réduisant de 0,5 à 0,7 °C par jour.
- Ventiler régulièrement, mais brièvement, afin de prévenir l'accumulation de CO2.
- Pour une longue conservation, l'emploi d'inhibiteurs de germination est conseillé.

prématurée.

- Pour une meilleure conservation, inclure du calcium et du bore dans la fertilisation.

