



France

- **Tuberi di grande calibro**
- **Ottimo sapore**
- **Buona resa**
- **Uniformità di calibro e di forma dei tuberi**
- **Eccellente qualità di frittura**



Caratteristiche agronomiche

Maturazione	65	Medio-precocce
Durata della dormienza	52	Mediamente breve
Resa	97	Bene
Calibro del tubero	81	Grosso
Forma del tubero		Ovale / Lunga-ovale
Numero di tuberi		12-14
Colore della pelle		Bruna = russet
Colore pasta cotta		Giallo chiaro
Tipo di cottura		B - Quasi farinosa
Sostanza secca/Amido		21,2% / 15,3%
Contenuto de sostanza se		390 / 1,084
Inbrunimento interno	9	Qualcosa sensibile
Sens. al Metribuzin	55	● ● ● ● ●
Tuberomania	90	● ● ● ● ●



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

Densità di semina

Mercato: 40-70 mm.

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/45	38.000	35	29
35/50	36.000	37	31
45/50	34.000	39	33
50/60	32.000	42	35

Profondità di semina: normale.

Controllare sempre il numero di tuberi per un calcolo accurato.

Resistenze

Peronospora fogliame	50	● ● ● ● ●
Peronospora del tubero	63	● ● ● ● ●
Alternaria	69	● ● ● ● ●
Scabbia comune	60	● ● ● ● ●
Scabbia pulverulenta	74	● ● ● ● ●
Macchie intern.nematodi	91	● ● ● ● ●
PVY	24	● ● ● ● ●
Yntn tolleranza tubero	98	● ● ● ● ●

Res. a nematodi

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	6	● ● ● ● ●
Ro5	*8	● ● ● ● ●
Pa2	7	● ● ● ● ●
Pa3	8	● ● ● ● ●

Res. a Rogna Nera

F1	10	● ● ● ● ●
F2	*5	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

Concimazione

- Dividere la somministrazione è consigliato per avere fogliame vigoroso e tuberi più grossi.
- Azoto (N): Bisogni molto alti (>250 kg N/ha inclusa la dotazione del terreno).
- Un alto livello di fosforo è consigliato al fine di favorire lo sviluppo del sistema radicale.
- Potassio (K): circa 200 kg K/ha prima della semina. Nei terreni con scarsa dotazione di potassio, somministrare 100 unità dopo la tuberizzazione.
- Manganese e magnesio stimolano lo sviluppo di un fogliame robusto e ritardano la senescenza.
- Al fine di ottenere una migliore conservazione dei tuberi, è consigliata la somministrazione di Calcio e Boro con la concimazione.



France



Preparazione dei tuberi e semina

- Bene riscaldare il seme. Seminare con un piccolo germoglio bianco.
- Trattare sempre il seme contro la Rhizoctonia.
- Migliori risultati sono conseguibili ove è possibile ricorrere all'irrigazione.




Coltivazione

- TIGER è abbastanza sensibile al metribuzin, usarlo solo in pre-emergenza.
- Mantenere un adeguato livello di umidità del suolo per ottenere un prodotto di qualità.
- TIGER è suscettibile all'Alternaria. Iniziare i trattamenti dal momento della fioritura.
- Attuare un'accurata protezione contro la Phytophthora, per prevenire danni al fogliame.



Maturazione e raccolta

- In caso di disseccamento del fogliame, attendere almeno tre settimane prima della raccolta.
- Prevenire i danni meccanici per migliorare la conservabilità.
- Ridurre la velocità di raccolta meccanica al fine di preservare i tuberi dai danni meccanici.
- Effettuare la raccolta solo quando le condizioni del suolo sono ottimali.



Conservazione

- Con una gestione adeguata del stoccaggio, TIGER è adatta per una lunga conservazione.
- Considerando il basso tasso di zuccheri riduttori, TIGER può essere conservata più a lungo anche a bassa temperatura.
- Controllare il prodotto durante il periodo di cicatrizzazione delle ferite.
- Dopo la raccolta, ridurre rapidamente la temperatura fino a 5 ° C. Adatto per lunghi periodi di conservazione fino ad aprile-maggio.
- Ridurre la temperatura di 0,5 - 0,7 gradi al giorno fino ad un valore stabile di 5°C.
- Ventilare regolarmente, ma per tempi brevi, per evitare l'accumulo di CO2.
- Per una lunga conservazione, è necessario usare un inibitore della germogliazione.