



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk

- Grove knollen
- Zeer goede smaak
- Goede opbrengst
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Uitstekende frites kwaliteit



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	65	Midden vroeg
Kiemrust	52	Vrij kort
Opbrengst rijp	97	Goed
Grofheid	81	Grof
Knolvorm		Ovaal / Lang-ovaal
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Bruin
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		21,2% / 15,3%
OWG/Soortelijk gewicht		390 / 1,084
Blauwgevoeligheid	9	Weinig gevoelig
Sencor gevoeligheid	55	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	90	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 40-70 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/45	38.000	35	29
35/50	36.000	37	31
45/50	34.000	39	33
50/60	32.000	42	35

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	50	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	63	● ● ● ● ●
Alternaria	69	● ● ● ● ●
Schurft	60	● ● ● ● ●
Poederschurft	74	● ● ● ● ●
Kringerigheid	91	● ● ● ● ●
Y-virus	24	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	98	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid		
Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	6	● ● ● ● ●
Ro5	*8	● ● ● ● ●
Pa2	7	● ● ● ● ●
Pa3	8	● ● ● ● ●

Wratziekte		
F1	10	● ● ● ● ●
F2	*5	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Een gedeelte gift wordt geadviseerd voor een vitaal gewas, dit zal resulteren in grovere knollen.
- Stikstof (N) : Erg hoge dosering (>250Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Een hoge beschikbaarheid van fosfaat wordt aanbevolen, om de ontwikkeling van het wortelstelsel te stimuleren.
- Kali: ca. 250 kg/ha. voor het poten. Bij kali-arme gronden nog een overbemesting van 100 kg/ha. na de knolzetting toedienen.
- Extra attentie voor mangaan en magnesium bladbemesting.
- Voeg Calcium en Borium aan de bemesting toe voor een betere bewaarbaarheid.



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk



Voorbehandeling en poten

- Warm het pootgoed op en plant de knollen met witte puntjes.
- Behandel TIGER pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
- Irrigatie wordt geadviseerd




Teelt

- TIGER is gevoelig voor metribuzin, kan alleen voor opkomst gespoten worden.
- Behoud een goed niveau van bodemvocht voor een goede opbrengst en kwaliteit.
- TIGER is gevoelig voor Alternaria. Start de gewasbescherming rond de bloeiperiode.
- Houd een strak spuitprogramma aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.



Loofdding en oogst

- Minimaal 3 weken tussen loofdding en rooien voor een goede huidvastheid.
- Voorkom mechanische beschadiging, om bewaarbaarheid te verbeteren.
- Beperk de snelheid van de rooimat en valhooftgtes om mechanische rooischade te voorkomen.
- Rooi alleen wanneer bodemcondities optimaal zijn.



Bewaring

- Met het juiste bewaarregime, is TIGER geschikt voor de lange bewaring.
- Door lage suikers: Kan TIGER ook bewaard worden op een lage temperatuur.
- Wondhelingsperiode in acht nemen.
- Na oogst, verlaag de temperatuur snel naar 5 °C
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, van 5°C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Voor lange bewaring moet gebruik worden gemaakt van kiemremmingsmiddelen.