




Consejos generales para la producción de consumo

- Alto rendimiento comercializable
- Tubérculo de calibre y forma uniformes
- Requisitos de longitud
- Apropiaada para almacenamientos largos



Propiedades agronómicas

Maduración	65	Semi-temprana
Período de dormencia	73	Largo
Producción	103	Bastante alta
Tamaño del tuberculo	79	Medio
Forma		Oval-alargada
Número de tubérculos		12-14
Color de piel		Amarilla
Color carne cocinar		Amarilla clara
Tipo de cocion		B - Ligeramente harinos
Materia seca/Almidon %		23% / 17%
/Peso específico		426 / 1,092
Golpeo interno	14	Bastante sensible
Sens. Metribuzin	65	● ● ● ● ●
Fenómeno patatitas	88	● ● ● ● ●



Color de piel y carne



Tipo de cocion



Maduración

Densidad de plantación

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	38.000	35	29
35/50	36.000	37	31
45/50	34.000	39	33
50/60	32.000	42	35
50/60 semilla cortada	38.000	35	29

Profundidad de plantación (calibre grande y medio) : 3 cm más profundo de lo normal.

Resistencias

Mildíu en planta	50	● ● ● ● ●
Mildíu en el tubérculo	70	● ● ● ● ●
Alternaria	71	● ● ● ● ●
Sarna común	62	● ● ● ● ●
Sarna verrugosa	62	● ● ● ● ●
Spraing	99	● ● ● ● ●
Virus Y	59	● ● ● ● ●
Tol. Yntn tubérculo	99	● ● ● ● ●

Res. a nemátodos		Roña	
Ro1/4	9	F1	8
Ro2/3	*6	F2	
Ro5	*5	F6	
Pa2		F18	
Pa3			

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

- Nitrógeno (N) : 210-250 kg N/Ha incluido las reservas del suelo.
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- Fertilización con fosfatos de acuerdo con la recomendación general.
- Potasio (K): circa 350 kg K/ha



Consejos generales para la producción de consumo



Cultivo

- TRAVOLTA tiene una dormencia larga.
-
- Tomar la precaución de hacer buenos caballones para evitar el verdeamiento.




Período de cultivo

- TRAVOLTA es sensible a Alternaria. Comenzar los tratamientos en el momento de la floración.
- Se aconsejan pulverizaciones preventivas contra Phytophthora.



Destrucción de las plantas

- TRAVOLTA es moderadamente susceptible al golpeo. Reducir caídas de altura y evitar los daños mecánicos.



Almacenamiento

- Tener cuidado con el período de curación de las heridas.
- Almacenar a una temperatura estable de 7 °C.
- Para almacenamientos largos se deben utilizar inhibidores de brotación.
- Con un manejo adecuado de almacén, es posible conservar TRAVOLTA por largos periodos.