




Conseils pour la production de pomme de terre de consommation

- Rendement commercialisable élevé
- Tubercules réguliers en forme et calibre
- Forme allongée
- Bonne aptitude à une longue conservation



Caractéristiques agronomiques

Maturité	65	Demi-hâtive
Période de dormance	73	Longue
Rendement à maturité	103	Moyen à élevé
Calibre	79	Moyen
Forme		Oblong allongé
Nombre de tubercules		12-14
Couleur de peau		Jaune
Chair après cuisson		Jaune clair
Type de cuisson		B - Légèrement farineux
Matière sèche/Amidon %		23% / 17%
Poids sous l'eau/		426 / 1,092
Noircissement interne	14	Moyennement sensible
Sens. à la Métribuzine	65	● ● ● ● ●
Boulage	88	● ● ● ● ●



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

Densité du peuplement

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs	
		75 cm	90 cm
28/35	45 000	30	25
35/45	38 000	35	29
35/50	36 000	37	31
45/50	34 000	39	33
50/60	32 000	42	35
50/60 coupé	38 000	35	29

Profondeur de plantation (gros et moyen calibres): 3 cm plus profond que la normale.

Résistances

Mildiou du feuillage	50	● ● ● ● ●
Mildiou du tubercule	70	● ● ● ● ●
Alternaria	71	● ● ● ● ●
Gale commune	62	● ● ● ● ●
Gale poudreuse	62	● ● ● ● ●
Virus rattle du tabac	99	● ● ● ● ●
Virus Y	59	● ● ● ● ●
Yntn virus sur tubercule	99	● ● ● ● ●

Nématodes

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*6	● ● ● ● ●
Ro5	*5	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Galle Verruqueuse

F1	8	● ● ● ● ●
F2		● ● ● ● ●
F6		● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

Fertilisation

- Azote (N) : 210-250 kg N/ha, reliquats inclus.
- Appliquer 2/3 avant la plantation et 1/3 en couverture.
- Fertilisation phosphatée selon les recommandations de l'analyse de sol.
- Potassium(K): environ 350 kg K/ha



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation



Plantation

- TRAVOLTA présente une longue dormance.
- Construire une butte importante pour éviter le verdissement des tubercules.




Culture

- TRAVOLTA est sensible à l'Alternaria. Commencer les traitements anti-alternaria au cours de la floraison.
- Un programme préventif anti-phytophthora est recommandé.



Défanage et Récolte

- TRAVOLTA est modérément sensible aux coups bleus. Diminuer la hauteur de chute et éviter les endommagements mécaniques.



Conservation

- Respecter la période de cicatrisation.
- Stocker à une température stabilisée de 7 °C.
- Pour une longue conservation, l'emploi d'inhibiteurs de germination est conseillé.
- Avec une gestion correcte du stockage, TRAVOLTA présente une bonne aptitude à la longue conservation.