




- **Rendimento commerciabile elevato**
- **Uniformità di calibro e di forma dei tuberi**
- **Lunghezza specifica**
- **Idonea per una lunga conservazione**



Caratteristiche agronomiche

Maturazione	65	Medio-precocce
Durata della dormienza	73	Lunga
Resa	103	Mediamente alta
Calibro del tubero	79	Medio
Forma del tubero		Lunga-ovale
Numero di tuberi		12-14
Colore della pelle		Gialla
Colore pasta cottura		Giallo chiaro
Tipo di cottura		B - Quasi farinosa
Sostanza secca/Amido		23% / 17%
Contenuto de sostanza se		426 / 1,092
Inbrunimento interno	14	Moderatamente sensibile
Sens. al Metribuzin	65	● ● ● ● ●
Tuberomania	88	● ● ● ● ●



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

Densità di semina

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	38.000	35	29
35/50	36.000	37	31
45/50	34.000	39	33
50/60	32.000	42	35
50/60 tubero-seme frazionato	38.000	35	29

Profondità di semina (grosso e medio calibro) : 3 cm più in profondità del normale.

Resistenze

Peronospora fogliame	50	● ● ● ● ●
Peronospora del tubero	70	● ● ● ● ●
Alternaria	71	● ● ● ● ●
Scabbia comune	62	● ● ● ● ●
Scabbia polverulenta	62	● ● ● ● ●
Macchie intern.nematodi	99	● ● ● ● ●
PVY	59	● ● ● ● ●
Yntn tolleranza tubero	99	● ● ● ● ●

Res. a nematodi

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*6	● ● ● ● ●
Ro5	*5	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Res. a Rogna Nera

F1	8	● ● ● ● ●
F2		● ● ● ● ●
F6		● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

Concimazione

- Azoto (N) : 210-250 kg N/ha inclusa la dotazione del terreno.
- Applicare 2/3 prima della semina ed 1/3 alla rincalzatura.
- Concimazione fosfatica in accordo con lo standard.
- Potassio (K) (circa 350 kg K/ha)



Preparazione dei tuberi e semina

- TRAVOLTA ha una lunga dormienza.
- Effettuare una buona rincalzatura per evitare la presenza di tuberi verdi.




Coltivazione

- TRAVOLTA è suscettibile all'Alternaria. Iniziare i trattamenti dal momento della fioritura.
- Trattamenti preventivi contro la Phytophthora sono necessari.



Maturazione e raccolta

- TRAVOLTA è moderatamente suscettibile agli urti. Ridurre l'altezza di caduta ed evitare danni meccanici.



Conservazione

- Controllare il prodotto durante il periodo di cicatrizzazione delle ferite.
- Conservare a temperatura costante di 7 °C.
- Per una lunga conservazione, è necessario usare un inibitore della germogliazione.
- Con una gestione adeguata del stoccaggio, TRAVOLTA è adatta per una lunga conservazione.