




Conselhos gerais na produção de batata de consumo

- Alto rendimento comercializável
- Calibre e forma dos tubérculos uniformes
- Critérios de comprimento
- Adequada para uma armazenagem de longa duração



Propriedades agronômicas

Maturação	65	Semi precoce
Periodo de dormencia	73	Longo
Produto final maturação	103	Moderado alto
Tamanho tubérculos	79	Medio
Forma dos tubérculos		Alongada-oval
Numero de tubérculos		12-14
Cor da pele		Amarela
Polpa após cozinhar		Amarela clara
Tipo culinário		B - Moderadamente farinô
Peso de matéria seca/Aln		23% / 17%
Teor de matéria seca/Pes		426 / 1,092
Enegrecimento interno	14	Moderado sensível
Sens. ao Metribuzin	65	● ● ● ● ●
Formacao de Batatinhas	88	● ● ● ● ●



Cor da pele e carne



Tipo culinário



Maturação

Densidade de Plantação

Calibre	Densidade de plantação/ha	Distancia entre linhas	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	38.000	35	29
35/50	36.000	37	31
45/50	34.000	39	33
50/60	32.000	42	35
50/60 semente cortada	38.000	35	29

Profundidade de plantação (grande e medio calibre) :
3 cm mais fundo do que o normal.

Resistências

Mildio da folha	50	● ● ● ● ●
Mildio do tuberculo	70	● ● ● ● ●
Alternaria	71	● ● ● ● ●
Sarna comum	62	● ● ● ● ●
Sarna pulvuro lenta	62	● ● ● ● ●
Spraing	99	● ● ● ● ●
PVY	59	● ● ● ● ●
Yntn tolerancia tubérculos	99	● ● ● ● ●

Res. aos nematodos

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*6	● ● ● ● ●
Ro5	*5	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Res. verruga

F1	8	● ● ● ● ●
F2		● ● ● ● ●
F6		● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

* HZPC own analysis/no official analysis

Fertilização

- Azoto (N) : 210-250 kg N/Ha incluindo a disponibilidade no solo.
- Aplicar 2/3 antes da plantação e 1/3 na cobertura.
- Adubação com Fosfatos de acordo com a recomendação padrão.
- Potássio (K): aprox. 350 kg/ha



Conselhos gerais na produção de batata de consumo



Preparação e Plantação

- TRAVOLTA tem uma dormência longa.
- Uma boa amontoa evita o aparecimento de tubérculos verdes.




Cultivo

- TRAVOLTA é suscetível à Alternaria. Começar tratamento no período da floração.
- Aconselham-se pulverizações preventivas contra o Míldio.



Defenagem e Colheita

- TRAVOLTA é moderadamente suscetível a golpes. Reduzir a altura de queda e evitar danos mecânicos.



Armazenamento

- Ter em atenção o período de cicatrização.
- Armazenar a uma temperatura estável de 7 °C.
- Para um armazenamento a longo prazo, é necessário usar anti-abrolhantes.
- Com as corretas condições, TRAVOLTA é adequada para armazenar longo período de tempo