



Teeltadvies Consumptieteelt CRISPS

- Hoog drogestofgehalte
- Goede bewaarbaarheid
- Goede chipskwaliteit
- Stabiel laag suikergehalte
- Am- resistentie tegen Ro1 & Ro2/3



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	64	Midden laat
Kiemrust	105	Zeer lang
Opbrengst rijp	92	Goed
Grofheid	79	Gemiddeld
Knolvorm		Rond / Rond-ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		BC - Kruimig
Droge stof/Zetmeel %		24,9% / 18,9%
OWG/Soortelijk gewicht		466 / 1,102
Blauwgevoeligheid	18	Gevoelig
Sencor gevoeligheid	66	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	90	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 40-85 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	65.000	21	17
35/50	54.000	25	21
45/55	48.000	28	23
35/55	50.000	27	22
50/60 gesneden	58.000	23	19

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Resistenties

Phytophthora loof	49	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	57	● ● ● ● ●
Alternaria	73	● ● ● ● ●
Schurft	48	● ● ● ● ●
Poederschurft	59	● ● ● ● ●
Kringerigheid	91	● ● ● ● ●
Y-virus	76	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	9	● ● ● ● ●
Ro5	*9	● ● ● ● ●
Pa2	7	● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	*5	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Een hoge beschikbaarheid van fosfaat wordt aanbevolen, om de ontwikkeling van het wortelstelsel te stimuleren.
- Een verse kaligift wordt aangeraden om blauw te voorkomen.



Teeltadvies Consumptieteelt CRISPS



Voorbehandeling en poten

- TRIPLE7 heeft een lange kiemrust.
- Een warmtestoot is gewenst om de kiemrust te doorbreken.
- Indien een topspruit aanwezig, verwijder deze en plant in het witte-puntjes-stadium.
- Plant niet direct vanuit de koeling, warm het pootgoed tijdig op voor planten.
- Behandel TRIPLE7 pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
- De beste kwaliteit wordt gerealiseerd op rijkere, middelzware kleigronden.
- Vermijd gronden met een hoog risico op poederschurft.
- Vermijd gronden met een hoog risico op gewone schurft.
- Kan worden geplant in het witte puntjes stadium. Voorkiemen kan de teelt vervroegen.




Teelt

- TRIPLE7 heeft een vroege knolzetting.
- TRIPLE7 heeft een trage opkomst maar het loof ontwikkelt zich sterk in een later stadium.
- TRIPLE7 is gevoelig voor metribuzin, kan alleen voor opkomst gespoten worden.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol.
- Gebruik later in het seizoen middelen met een goede knolbescherming.
- TRIPLE7 is weinig vatbaar voor gewone schurft.



Loofdding en oogst

- TRIPLE7 is vrij gevoelig voor stootblauw en rooibeschatiging. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.
- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- TRIPLE7 is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.



Bewaring

- TRIPLE7 heeft een lange kiemrust en is goed te bewaren.
- Wondhelingsperiode in acht nemen.
- Snel drogen en droog houden om zilverschurft te voorkomen.
- Bewaren bij een stabiele temperatuur van 8 °C.
- Voor lange bewaring moet gebruik worden gemaakt van kiemremmingsmiddelen.