




Anbauempfehlung Speisekartoffeln France

- Tiefgelbe Fleischfarbe
- Gute Speisequalität
- Vielseitige Sorte
- Hervorragende Backqualität
- Gute Lagerfähigkeit



Sorteneigenschaften

Reifezeit	63	Mittelspät
Keimruhe	70	Lang
Ertrag	97	Gut
Sortierung	83	Großfallend
Knollenform		Oval / Langoval
Knollenzahl		9-11
Schalenfarbe		Gelb
Fleischfarbe kochen		Gelb
Kochtyp		B - Vorwiegend Mehlig
TS/Stärke %		20,9% / 15,1%
UWG/Spez. Gewicht		385 / 1,083
Blaufleckigkeit	18	Empfindlich
Metribuzin Empf.	61	
Knöllchensucht	75	



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

Pflanzabstände

Marktsortierung: 40-70 mm.

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand	
		75 cm	90 cm
28/35	40 000	33	28
35/45	36 000	37	31
45/50	30 000	44	37

Pflanztiefe: normal

Immer die Knollenzahl prüfen für eine genaue Berechnung.

Resistenz

Krautfäule	39					
Knollenfäule	70					
Alternaria	76					
Schorf	52					
Pulverschorf	47					
Eisenfleckigkeit	76					
Y-Virus	39					
Yntn Knollentoleranz	96					

Nematodenresist.

Ro1/4	8						F1	10					
Ro2/3	*1						F2	6					
Ro5	*1						F6	6					
Pa2	*1						F18						
Pa3	*1												

* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Stickstoff (N): Mittlerer Bedarf (170-210kg N/Ha inklusive Bodenversorgung).
- Kalium- und Phosphatdüngung nach Standardempfehlung.



Anbauempfehlung Speisekartoffeln France



Vorbereitung und Pflanzung

- VICTORIA hat eine gute Keimruhe.
- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen an den örtlichen Gegebenheiten akklimatisieren.
- VICTORIA Pflanzgut immer gegen Rhizoctonia behandeln.
- Das Pflanzen mit kleinen weißen Keimen erzielt die besten Ergebnisse.
- Ein guter Dammaufbau ist erwünscht, um grüne Knollen vorzubeugen.




Anbau

- Die Entwicklung ist gleichmäßig, mit einer guten Laubentwicklung.
- hat einen späten Knollenansatz.
- VICTORIA wächst gut verteilt im Damm.
- Die Anwendung von Metribuzin wird im Voraufbau empfohlen. Im Nachaufbau sollte eine niedrige Dosierung eingesetzt werden.
- Die Witterungsbedingungen haben einen starken Einfluss auf die Effektivität von Metribuzin. Passen Sie die Dosis an die jeweiligen Umstände an.
- Die Krautfäulebehandlungen regelmäßig durchführen, um Kraut- und Knollenfäule vorzubeugen.



Krautregulierung und Ernte

- Ziel ist ein UWG von 355 Gramm.
- Zwischen Krautminderung und Ernte wird eine minimale Periode von drei Wochen empfohlen.
- VICTORIA ist mittelanfällig für Blaufleckigkeit, daher Fallhöhen reduzieren und mechanische Beschädigungen vermeiden.



Lagerung

- VICTORIA hat eine lange Keimruhe und eine gute Lagerfähigkeit.
- VICTORIA ist gut lagerfähig, auch über einen längeren Zeitraum.
- Schnell trocknen und trocken halten, um Silberschorf zu vermeiden.
- MECHANISCHE KÜHLUNG
- Temperatur täglich um 0,5 - 0,7 Grad bis auf eine stabile Temperatur von 6°C runterkühlen.
- Für längere Lagerung ist es notwendig, Keimhemmungsmittel einzusetzen.