



Anbauempfehlung Speisekartoffeln FRENCH FRIES

- Tiefgelbe Fleischfarbe
- Hoher Ertrag
- Gute Speisequalität
- Vielseitige Sorte
- Stabile und gute Backqualität



Sorteneigenschaften

Reifezeit	63	Mittelspät
Keimruhe	70	Lang
Ertrag	97	Gut
Sortierung	83	Großfallend
Knollenform		Oval / Langoval
Knollenzahl		9-11
Schalenfarbe		Gelb
Fleischfarbe kochen		Gelb
Kochtyp		B - Vorwiegend Mehlig
TS/Stärke %		20,9% / 15,1%
UWG/Spez. Gewicht		385 / 1,083
Blaufleckigkeit	18	Empfindlich
Metribuzin Empf.	61	●●●●●●
Knöllchensucht	75	●●●●●●



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

Pflanzabstände

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand	
		75 cm	90 cm
28/35	50 000	27	22
35/50	38 000	35	29
50/60	32 000	42	35
50/60 geschnitten	40 000	33	28

Pflanztiefe: normal

Resistenz

Krautfäule	39	●●●●●●
Knollenfäule	70	●●●●●●
Alternaria	76	●●●●●●
Schorf	52	●●●●●●
Pulverschorf	47	●●●●●●
Eisenfleckigkeit	76	●●●●●●
Y-Virus	39	●●●●●●
Yntn Knollentoleranz	96	●●●●●●

Nematodenresist.

Ro1/4	8	●●●●●●	F1	10	●●●●●●
Ro2/3	*1	●●●●●●	F2	6	●●●●●●
Ro5	*1	●●●●●●	F6	6	●●●●●●
Pa2	*1	●●●●●●	F18		●●●●●●
Pa3	*1	●●●●●●			

* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Der Nährstoffbedarf basiert auf den Bodenprobenergebnissen.
- Die Stickstoffgabe sollte zum 2/3 vor dem Pflanzen und zum 1/3 nach dem Knollenansatz erfolgen.
- Erste Zusatzdüngung (Stickstoff) direkt nach dem Knollenansatz.
- Stickstoff (N): Hoher Bedarf (210-250kg N/ha inklusive Bodenversorgung).
- Kalium- und Phosphatdüngung nach Standardempfehlung.



Anbauempfehlung Speisekartoffeln FRENCH FRIES



Vorbereitung und Pflanzung

- VICTORIA hat eine gute Keimruhe.
- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen an den örtlichen Gegebenheiten akklimatisieren.
- VICTORIA Pflanzgut und Boden immer gegen Rhizoctonia behandeln.
- Ist geeignet für alle Bodenarten.
- Beim Pflanzen sollte das Pflanzgut abgetrocknet sein um Infektionen vorzubeugen.
- Das Pflanzen mit kleinen weißen Keimen erzielt die besten Ergebnisse.




Anbau

- VICTORIA wächst gut verteilt im Damm.
- Normaler Auflauf.
- VICTORIA ist anfällig gegen Metribuzin, auch bei der Anwendung im Vorauflauf.
- VICTORIA ist nicht anfällig für Eisenfleckigkeit.



Krautregulierung und Ernte

- Die Knollen sollten vor der Ernte komplett schalenfest sein.
- VICTORIA ist mittelanfällig für Blaufleckigkeit, daher Fallhöhen reduzieren und mechanische Beschädigungen vermeiden.



Lagerung

- VICTORIA hat eine lange Keimruhe und eine gute Lagerfähigkeit.
- Gute Wundheilung ist wichtig.
- Bei einer stabilen Temperatur von 8 °C lagern.
- Regelmäßig aber kurz lüften, um eine CO₂-Anhäufung zu vermeiden.
- Für längere Lagerung ist es notwendig, Keimhemmungsmittel einzusetzen.

- **Gute Lagerfähigkeit**

