




## Producción de consumo France

- **Carne amarilla oscura**
- **Buena calidad culinaria**
- **Variedad multifuncional**
- **Excelente aptitud para frito casero**
- **Buen almacenamiento**



## Propiedades agronómicas

Maduración	63	Semi- tardia
Período de dormencia	70	Largo
Producción	97	Bien
Tamaño del tubérculo	83	Calibre grande
Forma		Oval / Alargada-oval
Número de tubérculos		9-11
Color de piel		Amarilla
Color carne cocinar		Amarilla
Tipo de cocion		B - Ligeramente harinos
Materia seca/Almidon %		20,9% / 15,1%
/Peso específico		385 / 1,083
Golpeo interno	18	Sensible
Sens. Metribuzin	61	●●●●●
Fenómeno patatitas	75	●●●●●



Color de piel y carne



Tipo de cocion



Maduración

## Densidad de plantación

Calibre comercial: 40-70 mm.

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/35	40.000	33	28
35/45	36.000	37	31
45/50	30.000	44	37

Profundidad de plantación: normal.

Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.

## Resistencias

Mildió en planta	39	●●●●●
Mildió en el tubérculo	70	●●●●●
Alternaria	76	●●●●●
Sarna común	52	●●●●●
Sarna verrugosa	47	●●●●●
Spraing	76	●●●●●
Virus Y	39	●●●●●
Tol. Yntn tubérculo	96	●●●●●

### Res. a nemátodos

Ro1/4	8	●●●●●
Ro2/3	*1	●●●●●
Ro5	*1	●●●●●
Pa2	*1	●●●●●
Pa3	*1	●●●●●

### Roña

F1	10	●●●●●
F2	6	●●●●●
F6	6	●●●●●
F18		●●●●●

## Fertilización

- 
- Nitrógeno (N): aporte medio (170-210Kg N/Ha incluido las reservas del suelo).
- Fertilización con potasio y fosfato como recomendación general.

\* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial



## Producción de consumo France



### Cultivo

- VICTORIA tiene una buena dormencia.
- Antes de la plantación, permitir que la semilla se aclimate a las condiciones locales.
- Tratar siempre la semilla de VICTORIA contra rizoctonia.
- Al plantar con yemas blanquecinas se obtienen los mejores resultados.
- Tomar la precaución de hacer buenos caballones para evitar el verdeamiento.




### Período de cultivo

- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta.
- La tuberización es tardía.
- VICTORIA produce las patatas esparcidas por todo el caballón.
- El uso de metribuzin se recomienda en preemergencia. En postemergencia utilizar dosis bajas.
- Las condiciones climáticas tienen una fuerte influencia en la efectividad del metribuzin, hay que adaptar la dosis según las circunstancias.
- Utilizar un programa estricto para la protección contra Phytophthora, debido a la susceptibilidad en la planta.



### Dstrucción de las plantas

- Materia seca deseada del 19,5 %.
- Mínimo tres semanas entre el quemado y la recogida para un correcto fijado de la piel.
- VICTORIA es moderadamente susceptible al golpeo. Reducir caídas de altura y evitar los daños mecánicos.



### Almacenamiento

- VICTORIA tiene una dormencia larga y un buen almacenamiento.
- VICTORIA tiene buen almacenamiento, también para períodos largos.
- Secar rápidamente y mantener el producto seco para evitar la sarna plateada.
- ALMACENAMIENTO EN CÁMARA FRIGORÍFICA
- Reducir la temperatura 0,5-0,7 °C por día hasta un valor estable de 6°C.
- Para almacenamientos largos se deben utilizar inhibidores de brotación.