




Conseils pour la production de pomme de terre de consommation France

- Chair jaune foncé
- Bonne qualité culinaire
- Variété polyvalente
- Excellente aptitude à la friture
- Bonne aptitude au stockage



Caractéristiques agronomiques

Maturité	63	Demi-tardive
Période de dormance	70	Longue
Rendement à maturité	97	Moyen
Calibre	83	Gros
Forme		Oblong / Oblong allongé
Nombre de tubercules		9-11
Couleur de peau		Jaune
Chair après cuisson		Jaune
Type de cuisson		B - Légèrement farineux
Matière sèche/Amidon %		20,9% / 15,1%
Poids sous l'eau/		385 / 1,083
Noircissement interne	18	Sensible
Sens. à la Métribuzine	61	● ● ● ● ●
Boulage	75	● ● ● ● ●



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

Densité du peuplement

Objectif commercial: 40-70 mm.

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs	
		75 cm	90 cm
28/35	40 000	33	28
35/45	36 000	37	31
45/50	30 000	44	37

Profondeur de plantation: normale.

Toujours vérifier le nombre de tubercules/kg pour une densité de plantation plus précise.

Résistances

Mildiou du feuillage	39	● ● ● ● ●
Mildiou du tubercule	70	● ● ● ● ●
Alternaria	76	● ● ● ● ●
Gale commune	52	● ● ● ● ●
Gale poudreuse	47	● ● ● ● ●
Virus rattle du tabac	76	● ● ● ● ●
Virus Y	39	● ● ● ● ●
Yntn virus sur tubercule	96	● ● ● ● ●

Nématodes

Ro1/4	8	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2	*1	● ● ● ● ●
Pa3	*1	● ● ● ● ●

Galle Verruqueuse

F1	10	● ● ● ● ●
F2	6	● ● ● ● ●
F6	6	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●


* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

Fertilisation

- Toujours se référer aux conditions légales en vigueur dans votre Région.
- Azote (N): Besoins moyens (170-210 kg N/ha, reliquats inclus).
- Fertilisation phospho-potassique selon analyse de sol.



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation France



Plantation

- VICTORIA présente une longue dormance.
- Habituer les plants à la température ambiante avant plantation.
- Toujours traiter les plants de VICTORIA contre le rhizoctone.
- Planter des plants au stade point blanc donne les meilleurs résultats.
- Construire une butte importante pour éviter le verdissement des tubercules.




Culture

- La levée est homogène, avec un bon développement du feuillage.
- La tubérisation est tardive.
- VICTORIA tubérise dans l'intégralité de la butte.
- L'utilisation de la métribuzine est recommandée en pré-levée. En cas de traitement post-levée, nous recommandons l'application de faibles doses.
- Pour une bonne efficacité, adapter la dose de métribuzine en fonction des conditions météo.
- Utiliser un programme efficace pour prévenir le mildiou du feuillage.



Défanage et Récolte

- Viser une teneur en matière sèche de 19,5 %.
- Respecter un délai défanage - récolte de 3 semaines minimum.
- VICTORIA est modérément sensible aux coups bleus. Diminuer la hauteur de chute et éviter les endommagements mécaniques.



Conservation

- VICTORIA a une longue dormance et une bonne aptitude à la conservation.
- VICTORIA est adaptée au stockage, même pour de longues périodes.
- Sécher rapidement et conserver au sec pour éviter l'apparition de gale argentée.
- STOCKAGE AU FRIGO
- Stabiliser la température à 6 °C en la réduisant de 0,5 à 0,7 °C par jour.
- Pour une longue conservation, l'emploi d'inhibiteurs de germination est conseillé.