




Conseils pour la production de pomme de terre de consommation FRENCH FRIES

- Chair jaune foncé
- Potentiel de rendement très élevé
- Bonne qualité culinaire
- Variété polyvalente
- Très bonne aptitude à la friture



Caractéristiques agronomiques

Maturité	63	Demi-tardive
Période de dormance	70	Longue
Rendement à maturité	97	Moyen
Calibre	83	Gros
Forme	Oblong / Oblong allongé	
Nombre de tubercules	9-11	
Couleur de peau	Jaune	
Chair après cuisson	Jaune	
Type de cuisson	B - Légèrement farineux	
Matière sèche/Amidon %	20,9% / 15,1%	
Poids sous l'eau/	385 / 1,083	
Noircissement interne	18	Sensible
Sens. à la Métribuzine	61	● ● ● ● ●
Boulage	75	● ● ● ● ●



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

Densité du peuplement

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs	
		75 cm	90 cm
28/35	50 000	27	22
35/50	38 000	35	29
50/60	32 000	42	35
50/60 coupé	40 000	33	28

Profondeur de plantation: normale.

Résistances

Mildiou du feuillage	39	● ● ● ● ●
Mildiou du tubercule	70	● ● ● ● ●
Alternaria	76	● ● ● ● ●
Gale commune	52	● ● ● ● ●
Gale poudreuse	47	● ● ● ● ●
Virus rattle du tabac	76	● ● ● ● ●
Virus Y	39	● ● ● ● ●
Yntn virus sur tubercule	96	● ● ● ● ●

Nématodes

Ro1/4	8	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2	*1	● ● ● ● ●
Pa3	*1	● ● ● ● ●

Galle Verruqueuse

F1	10	● ● ● ● ●
F2	6	● ● ● ● ●
F6	6	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

Fertilisation

- Adapter la fertilisation selon l'analyse de sol.
- Appliquer 2/3 avant la plantation et 1/3 en couverture.
- Premier apport d'azote en couverture, immédiatement après l'initiation du tubercule.
- Azote (N): Besoins élevés (210-250 kg N/ha, reliquats inclus).
- Fertilisation phospho-potassique selon analyse de sol.



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation FRENCH FRIES



Plantation

- VICTORIA présente une longue dormance.
- Habituer les plants à la température ambiante avant plantation.
- Toujours traiter les plants de VICTORIA et le sol contre le rhizoctone.
- VICTORIA peut être cultivée sur tous types de sols.
- Éviter la condensation sur les plants pour empêcher leur contamination par des maladies.
- Planter des plants au stade point blanc donne les meilleurs résultats.




Culture

- VICTORIA tubérise dans l'intégralité de la butte.
- La levée est normale.
- VICTORIA est sensible à la métribuzine, y compris en cas de traitement pré-levée.
- VICTORIA est assez résistante à la nécrose annulaire.



Défanage et Récolte

- La peau doit être totalement formée avant la récolte.
- VICTORIA est modérément sensible aux coups bleus. Diminuer la hauteur de chute et éviter les endommagements mécaniques.



Conservation

- VICTORIA a une longue dormance et une bonne aptitude à la conservation.
- Respecter la période de cicatrisation.
- Stocker à une température stabilisée de 8 °C.
- Ventiler régulièrement, mais brièvement, afin de prévenir l'accumulation de CO2.
- Pour une longue conservation, l'emploi d'inhibiteurs de germination est conseillé.

- **Bonne aptitude au stockage**

