




France

- Pasta di colore giallo intenso
- Buona qualità di cottura
- Varietà multiuso
- Eccellente qualità di frittura
- Buona conservabilità



Caratteristiche agronomiche

Maturazione	63	Medio-tardiva
Durata della dormienza	70	Lunga
Resa	97	Bene
Calibro del tubero	83	Grosso
Forma del tubero		Ovale / Lunga-ovale
Numero di tuberi		9-11
Colore della pelle		Gialla
Colore pasta cottura		Giallo
Tipo di cottura		B - Quasi farinosa
Sostanza secca/Amido		20,9% / 15,1%
Contenuto de sostanza se		385 / 1,083
Inbrunimento interno	18	Sensibile
Sens. al Metribuzin	61	●●●●●
Tuberomania	75	●●●●●



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

Densità di semina

Mercato: 40-70 mm.

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila	
		75 cm	90 cm
28/35	40.000	33	28
35/45	36.000	37	31
45/50	30.000	44	37

Profondità di semina: normale.

Controllare sempre il numero di tuberi per un calcolo accurato.

Resistenze

Peronospora fogliame	39	●●●●●
Peronospora del tubero	70	●●●●●
Alternaria	76	●●●●●
Scabbia comune	52	●●●●●
Scabbia polverulenta	47	●●●●●
Macchie intern.nematodi	76	●●●●●
PVY	39	●●●●●
Yntn tolleranza tubero	96	●●●●●

Res. a nematodi

Ro1/4	8	●●●●●
Ro2/3	*1	●●●●●
Ro5	*1	●●●●●
Pa2	*1	●●●●●
Pa3	*1	●●●●●

Res. a Rogna Nera

F1	10	●●●●●
F2	6	●●●●●
F6	6	●●●●●
F18		●●●●●

Concimazione

-
- Azoto (N): Bisogni medi (170-210 kg N/ha inclusa la dotazione del terreno).
- Distribuire quantità di fosforo e potassio seguendo i criteri standard.

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale



France



Preparazione dei tuberi e semina

- VICTORIA ha buona dormienza.
- Permettere al seme di acclimatarsi alle condizioni locali prima di piantare.
- Trattare sempre il seme contro la Rhizoctonia.
- Piantare quando le gemme dei tuberi sono aperte per avere un risultato migliore.
- Effettuare una buona rincalzatura per evitare la presenza di tuberi verdi.




Coltivazione

- L'emergenza è uniforme con un buon sviluppo fogliare.
- La tuberizzazione è tardiva.
- VICTORIA cresce diffusamente sulla cresta.
- L'uso del metribuzin è consigliato in pre-emergenza. In caso di post-emergenza, usare un dosaggio inferiore.
- Le condizioni climatiche hanno una notevole influenza sull'efficacia del metribuzin, usare una dose adatta alle circostanze.
- Attuare un'accurata protezione contro la Phytophthora, per prevenire danni al fogliame.



Maturazione e raccolta

- Cercare di ottenere un contenuto di sostanza secca del 19,5 %.
- In caso di disseccamento del fogliame, attendere almeno tre settimane prima della raccolta.
- VICTORIA è moderatamente suscettibile agli urti. Ridurre l'altezza di caduta ed evitare danni meccanici.



Conservazione

- VICTORIA ha una lunga dormienza e buona conservabilità.
- VICTORIA è ben conservabile, anche per un lungo periodo.
- Lavare rapidamente e tenere asciutto per evitare la scabbia argentea.
- CONSERVARE IN FRIGO.
- Ridurre la temperatura di 0,5 - 0,7 gradi al giorno fino ad un valore stabile di 6°C.
- Per una lunga conservazione, è necessario usare un inibitore della germogliazione.