




Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk

- Donkergeel vlees
- Goede kookkwaliteit
- Veelzijdig ras
- Uitstekende frites kwaliteit
- Goede bewaarbaarheid



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	63	Midden laat
Kiemrust	70	Lang
Opbrengst rijp	97	Goed
Grofheid	83	Grof
Knolvorm		Ovaal / Lang-ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		20,9% / 15,1%
OWG/Soortelijk gewicht		385 / 1,083
Blauwgevoeligheid	18	Gevoelig
Sencor gevoeligheid	61	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	75	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 40-70 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijfstand	
		75 cm	90 cm
28/35	40.000	33	28
35/45	36.000	37	31
45/50	30.000	44	37

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	39	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	70	● ● ● ● ●
Alternaria	76	● ● ● ● ●
Schurft	52	● ● ● ● ●
Poederschurft	47	● ● ● ● ●
Kringerigheid	76	● ● ● ● ●
Y-virus	39	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	96	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	8	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2	*1	● ● ● ● ●
Pa3	*1	● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	6	● ● ● ● ●
F6	6	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk



Voorbehandeling en poten

- VICTORIA heeft een goede kiemrust.
- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- Behandel VICTORIA pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
- Planten in het witte-puntjes-stadium geeft de beste resultaten.
- Zorg voor een goede rugopbouw om groene knollen te voorkomen.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- VICTORIA heeft een late knolzetting.
- Groeit verspreid in de rug.
- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- De weersomstandigheden hebben een grote invloed op de effectiviteit van metribuzin, pas de dosering aan de weersomstandigheden aan.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.



Loofdding en oogst

- Streef naar een onderwatergewicht van 355 gram.
- Minimaal 3 weken tussen loofdding en rooien voor een goede huidvastheid.
- VICTORIA is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.



Bewaring

- VICTORIA heeft een lange kiemrust en is goed te bewaren.
- Geschikt voor lange bewaring.
- Snel drogen en droog houden om zilverschurft te voorkomen.
- MECHANISCHE KOELING
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, van 6°C.
- Voor lange bewaring moet gebruik worden gemaakt van kiemremmingsmiddelen.