




Teeltadvies Consumptieteelt FRENCH FRIES

- Donkergeel vlees
- Hoge opbrengst
- Goede kookkwaliteit
- Veelzijdig ras
- Consistente goede bakkwaliteit



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	63	Midden laat
Kiemrust	70	Lang
Opbrengst rijp	97	Goed
Grofheid	83	Grof
Knolvorm		Ovaal / Lang-ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		20,9% / 15,1%
OWG/Soortelijk gewicht		385 / 1,083
Blauwgevoeligheid	18	Gevoelig
Sencor gevoeligheid	61	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	75	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/50	38.000	35	29
50/60	32.000	42	35
50/60 gesneden	40.000	33	28

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Resistenties

Phytophthora loof	39	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	70	● ● ● ● ●
Alternaria	76	● ● ● ● ●
Schurft	52	● ● ● ● ●
Poederschurft	47	● ● ● ● ●
Kringerigheid	76	● ● ● ● ●
Y-virus	39	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	96	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	8	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2	*1	● ● ● ● ●
Pa3	*1	● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	6	● ● ● ● ●
F6	6	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Nutrient Management Gids (RB209), Groep 3
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- De eerste overbemesting van stikstof direct na de knolzetting toedienen.
- Stikstof (N) : Hoge dosering (210-250Kg N/Ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Teeltadvies Consumptieteelt FRENCH FRIES



Voorbehandeling en poten

- VICTORIA heeft een goede kiemrust.
- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- Behandel VICTORIA pootgoed en de grond tegen Rhizoctonia.
- VICTORIA is geschikt voor alle grondsoorten.
- Plant pootgoed dat vrij is van condens om versmering te voorkomen.
- Planten in het witte-puntjes-stadium geeft de beste resultaten.




Teelt

- Groeit verspreid in de rug.
- Normale opkomst.
- VICTORIA is gevoelig voor metribuzin, ook bij toediening voor de opkomst.
- VICTORIA heeft een hoge resistentie tegen TRV.



Loofdding en oogst

- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- VICTORIA is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.



Bewaring

- VICTORIA heeft een lange kiemrust en is goed te bewaren.
- Wondhelingsperiode in acht nemen.
- Bewaren bij een stabiele temperatuur van 8 °C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO₂-ophoping te voorkomen.
- Voor lange bewaring moet gebruik worden gemaakt van kiemremmingsmiddelen.

● **Goede bewaarbaarheid**

