




Produção de batata de consumo France

- Polpa amarela escura
- Boa qualidade culinária
- Variedade polivalente
- Excelente qualidade fritura
- Boa capacidade de Armazenamento



Propriedades agronômicas

Maturação	63	Semi tardia
Periodo de dormencia	70	Longo
Produto final maturação	97	Bom
Tamanho tubérculos	83	Grande calibre
Forma dos tubérculos		Oval / Alongada-oval
Numero de tubérculos		9-11
Cor da pele		Amarela
Polpa após cozinhar		Amarela
Tipo culinário		B - Moderadamente farinif
Peso de matéria seca/Aln		20,9% / 15,1%
Teor de matéria seca/Pes		385 / 1,083
Enegrecimento interno	18	Sensível
Sens. ao Metribuzin	61	● ● ● ● ●
Formacao de Batatinhas	75	● ● ● ● ●



Cor da pele e carne



Tipo culinário



Maturação

Densidade de Plantação

Mercado: 40-70 mm.

Calibre	Densidade de plantação/ha	Distancia entre linhas	
		75 cm	90 cm
28/35	40.000	33	28
35/45	36.000	37	31
45/50	30.000	44	37

Profundidade de plantação: normal.

Verificar sempre a contagem de tubérculos para um cálculo correto.

Resistências

Mildio da folha	39	● ● ● ● ●
Mildio do tuberculo	70	● ● ● ● ●
Alternaria	76	● ● ● ● ●
Sarna comum	52	● ● ● ● ●
Sarna pulvuro lenta	47	● ● ● ● ●
Spraing	76	● ● ● ● ●
PVY	39	● ● ● ● ●
Yntn tolerancia tubérculos	96	● ● ● ● ●

Res. aos nematodos

Ro1/4	8	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2	*1	● ● ● ● ●
Pa3	*1	● ● ● ● ●

Res. verruga

F1	10	● ● ● ● ●
F2	6	● ● ● ● ●
F6	6	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

* HZPC own analysis/no official analysis

Fertilização

-
- Azoto (N): Aplicação média (170-210Kg N/Ha incluindo a disponibilidade no solo).
- Adubação com Potássio e Fosfatos de acordo com a recomendação padrão.



Produção de batata de consumo France



Preparação e Plantação

- VICTORIA tem uma boa dormência.
- Permitir que a semente se adapte às condições locais antes da plantação.
- Tratar sempre as sementes de VICTORIA e o solo contra Rhizoctonia.
- Plantar com pequenos brotos brancos proporciona melhores resultados.
- Uma boa amontoa evita o aparecimento de tubérculos verdes.




Cultivo

- Emergência uniforme, com um bom desenvolvimento da folhagem.
- A tuberização é tardia.
- VICTORIA desenvolve-se ao longo de todo o camalhão.
- Recomenda-se a utilização de Metribuzina em pré-emergência. Em caso de pós-emergência, utilizar doses mais baixas.
- "As condições climáticas têm uma forte influência no efeito da Metribuzina
- Utilizar um plano de tratamentos, devido ao elevado risco do Míldio da folha.



Defenagem e Colheita

- Para obter teor de matéria seca de 19,5 %.
- Mínimo de 3 semanas entre a dessecagem das plantas e o arranque para ter uma pele completamente firme.
- VICTORIA é moderadamente suscetível a golpes. Reduzir a altura de queda e evitar danos mecânicos.



Armazenamento

- VICTORIA tem uma boa dormência e boa capacidade de armazenamento.
- VICTORIA é adequada para armazenamento, inclusivamente por períodos mais longo.
- Secar rapidamente e manter o produto seco para evitar a sarna prateada.
- ARMAZENAMENTO EM CÂMARA FRIGORIFICA
- Reduzir a temperatura 0,5 °C-0,7 °C por dia, até um valor estável de 6°C.
- Para um armazenamento a longo prazo, é necessário usar anti-abrolhantes.