




Produção de batata de consumo FRENCH FRIES

- Polpa amarela escura
- Alto rendimento
- Boa qualidade culinária
- Variedade polivalente
- Qualidade de fritura alta e constante



Propriedades agronômicas

Maturação	63	Semi tardia
Periodo de dormencia	70	Longo
Produto final maturação	97	Bom
Tamanho tubérculos	83	Grande calibre
Forma dos tubérculos		Oval / Alongada-oval
Numero de tubérculos		9-11
Cor da pele		Amarela
Polpa após cozinhar		Amarela
Tipo culinário		B - Moderadamente farinif
Peso de matéria seca/Aln		20,9% / 15,1%
Teor de matéria seca/Pes		385 / 1,083
Enegrecimento interno	18	Sensível
Sens. ao Metribuzin	61	● ● ● ● ●
Formacao de Batatinhas	75	● ● ● ● ●



Cor da pele e carne



Tipo culinário



Maturação

Densidade de Plantação

Calibre	Densidade de plantação/ha	Distancia entre linhas	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/50	38.000	35	29
50/60	32.000	42	35
50/60 semente cortada	40.000	33	28

Profundidade de plantação: normal.

Resistências

Mildio da folha	39	● ● ● ● ●
Mildio do tuberculo	70	● ● ● ● ●
Alternaria	76	● ● ● ● ●
Sarna comum	52	● ● ● ● ●
Sarna pulvuro lenta	47	● ● ● ● ●
Spraing	76	● ● ● ● ●
PVY	39	● ● ● ● ●
Yntn tolerancia tubérculos	96	● ● ● ● ●

Res. aos nematodos

Ro1/4	8	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2	*1	● ● ● ● ●
Pa3	*1	● ● ● ● ●

Res. verruga

F1	10	● ● ● ● ●
F2	6	● ● ● ● ●
F6	6	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●


* HZPC own analysis/no official analysis

Fertilização

- Adaptar a fertilização em função das análises do solo.
-
- Aplicar 2/3 antes da plantação e 1/3 na cobertura.
- Primeira aplicação de azoto (N), imediatamente após o início da tuberização.
- Azoto (N): Aplicação elevada (210-250Kg N/Ha incluindo a disponibilidade no solo).
- Adubação com Potássio e Fosfatos de acordo com a recomendação padrão.



Produção de batata de consumo FRENCH FRIES



Preparação e Plantação

- VICTORIA tem uma boa dormência.
- Permitir que a semente se adapte às condições locais antes da plantação.
- Tratar sempre sementes de VICTORIA e o solo contra Rhizoctonia.
- VICTORIA pode ser cultivada em todos os tipos de solo.
- Plantar semente isenta de condensação para prevenir a contaminação de doenças.
- Plantar com pequenos brotos brancos proporciona melhores resultados.




Cultivo

- VICTORIA desenvolve-se ao longo de todo o camalhão.
- A emergência é normal.
- VICTORIA é suscetível à Metribuzina, também em aplicação de pré-emergência.
- VICTORIA é bastante resistente ao vírus TRV- PMTV.



Defenagem e Colheita

- A pele deve estar firme antes do arranque.
- VICTORIA é moderadamente suscetível a golpes. Reduzir a altura de queda e evitar danos mecânicos.



Armazenamento

- VICTORIA tem uma boa dormência e boa capacidade de armazenamento.
- Ter em atenção o período de cicatrização.
- Armazenar a uma temperatura estável de 8 °C.
- Ventilar com regularidade para evitar acumulação de CO2.
- Para um armazenamento a longo prazo, é necessário usar anti-abrolhantes.

- **Boa capacidade de Armazenamento**

