




Producción de consumo TRADITIONAL FRESH

- Tubérculos grandes
- Piel brillante muy atractiva
- Buena producción
- Variedad multifuncional
- Buena resistencia al envasado



Propiedades agronómicas

Maduración	59	Semi- tardia
Período de dormencia	70	Largo
Producción	106	Alta
Producción	107	Alta
Tamaño del tuberculo	83	Calibre grande
Forma		Oval-alargada
Número de tubérculos	9-11	
Color de piel		Amarilla clara
Color carne cocinar		Amarilla
Tipo de cocion		B - Ligeramente harinos
Materia seca/Almidon %	20,9% / 15,1%	
/Peso específico	385 / 1,083	
Golpeo interno	7	Algo sensible
Sens. Metribuzin	83	● ● ● ● ●
Fenómeno patatitas	75	● ● ● ● ●



Color de piel y carne



Tipo de cocion



Maduración

Densidad de plantación

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/35	47.500	28	23
35/45	42.000	32	26
35/55	37.000	36	30
50/55	35.000	38	32
55/65	33.500	40	33

Profundidad de plantación: normal.

Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.

Resistencias

Mildíu en planta	52	● ● ● ● ●
Mildíu en el tubérculo	71	● ● ● ● ●
Alternaria	76	● ● ● ● ●
Sarna común	57	● ● ● ● ●
Sarna verrugosa	50	● ● ● ● ●
Spraing	55	● ● ● ● ●
Virus Y	12	● ● ● ● ●
Tol. Yntn tubérculo	99	● ● ● ● ●

Res. a nemátodos		Roña	
Ro1/4 *1	● ● ● ● ●	F1 3	● ● ● ● ●
Ro2/3 *1	● ● ● ● ●	F2 *1	● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ●	F6 4	● ● ● ● ●
Pa2 4	● ● ● ● ●	F18 3	● ● ● ● ●
Pa3 3	● ● ● ● ●		


* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Alta demanda de nitrógeno, especialmente durante el desarrollo inicial.
- El nitrógeno puede aplicarse en una dosis. Esto ayuda a adelantar la cosecha.
- Nitrógeno (N): aporte medio (170-210Kg N/Ha incluido las reservas del suelo).
- Fertilización con potasio y fosfato como recomendación general.
- No utilizar abono orgánico



Producción de consumo TRADITIONAL FRESH



Cultivo

- VOYAGER tiene una dormencia larga.
- Para romper la dormencia es preferible un tratamiento con calor.
- Preferible cultivar en terrenos ligeros, no demasiado ricos o incluso en terrenos pobres.
- Puede plantarse con pequeñas yemas blanquecinas, pero una buena prebrotación puede adelantar la cosecha.
- Se aconseja una plantación temprana.




Período de cultivo

- La tuberización es tardía.
- VOYAGER tiene una emergencia lenta, pero más tarde el follaje dará lugar a una planta fuerte.
- Usar productos que tengan efecto en Alternaria solani y Alternaria alternata.
- A pesar de su buena resistencia contra Phytophthora, se aconsejan aplicaciones preventivas en ciclos de cultivo largos.
- VOYAGER es un poco sensible a la sarna común.
- VOYAGER es bastante resistente al virus TVR.



Destrucción de las plantas

- Asegurarse de que el cultivo esté maduro en el momento de la destrucción de la planta.



Almacenamiento

- VOYAGER es un poco susceptible a Fusarium.
- Ventilar de forma regular pero breve para prevenir la acumulación de CO2.
- Buen almacenamiento a temperatura constante.
- VOYAGER tiene una dormencia larga. Los inhibidores de brotación solo se necesitan para entregas tardías.