




Conseils pour la production de pomme de terre de consommation TRADITIONAL FRES

- Tubercules de gros calibres
- Peau très brillante et attractive
- Bon potentiel de rendement
- Variété polyvalente
- Bon profil agronomique



Caractéristiques agronomiques

Maturité	59	Demi-tardive
Période de dormance	70	Longue
Rendement précoce	106	Élevé
Rendement à maturité	107	Élevé
Calibre	83	Gros
Forme		Oblong allongé
Nombre de tubercules		9-11
Couleur de peau		Jaune clair
Chair après cuisson		Jaune
Type de cuisson		B - Légèrement farineux
Matière sèche/Amidon %		20,9% / 15,1%
Poids sous l'eau/		385 / 1,083
Noircissement interne	7	Peu sensible
Sens. à la Métribuzine	83	● ● ● ● ●
Boulage	75	● ● ● ● ●



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

Densité du peuplement

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs	
		75 cm	90 cm
28/35	47 500	28	23
35/45	42 000	32	26
35/55	37 000	36	30
50/55	35 000	38	32
55/65	33.500	40	33

Profondeur de plantation: normale.

Toujours vérifier le nombre de tubercules/kg pour une densité de plantation plus précise.

Résistances

Mildiou du feuillage	52	● ● ● ● ●
Mildiou du tubercule	71	● ● ● ● ●
Alternaria	76	● ● ● ● ●
Gale commune	57	● ● ● ● ●
Gale poudreuse	50	● ● ● ● ●
Virus rattle du tabac	55	● ● ● ● ●
Virus Y	12	● ● ● ● ●
Yntn virus sur tubercule	99	● ● ● ● ●

Nématodes

Ro1/4 *1	● ● ● ● ●
Ro2/3 *1	● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ●
Pa2 4	● ● ● ● ●
Pa3 3	● ● ● ● ●

Galle Verruqueuse

F1 3	● ● ● ● ●
F2 *1	● ● ● ● ●
F6 4	● ● ● ● ●
F18 3	● ● ● ● ●


* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

Fertilisation

- Adapter la fertilisation selon l'analyse de sol.
- Gros besoins en azote, particulièrement en début de cycle.
- L'azote peut être apporté en une seule fois, ceci aidant à avoir une culture plus précoce.
- Azote (N): Besoins moyens (170-210 kg N/ha, reliquats inclus).
- Fertilisation phospho-potassique selon analyse de sol.
- Ne pas utiliser de fumure organique.



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation TRADITIONAL FRES




Plantation

- VOYAGER présente une longue dormance.
- Nous recommandons de bien réchauffer les plants pour lever la dormance.
- Mieux adaptée à des sols légers, pas trop riches ou même pauvres.
- Peut être plantée au stade point blanc, mais une prégermination bien faite rendra la culture plus hâtive.
- Recommandée en plantation précoce.




Culture

- La tubérisation est tardive.
- VOYAGER a une levée lente. Dans un second temps, le feuillage se développera ensuite en une plante robuste.
- Utiliser des produits qui ont un effet sur *Alternaria solani* et *Alternaria alternata*.
- En dépit d'une tolérance satisfaisante au *Phytophthora* sur le feuillage, un traitement préventif régulier est nécessaire pour les cultures tardives.
- VOYAGER est peu sensible à la gale commune.
- VOYAGER est assez résistante à la nécrose annulaire.



Défanage et Récolte

- Vérifier que la culture est arrivée à maturité avant défanage.



Conservation

- VOYAGER est peu sensible au *Fusarium*.
- Ventiler régulièrement, mais brièvement, afin de prévenir l'accumulation de CO2.
- Bonne aptitude au stockage si la température est gardée stable.
- VOYAGER a une longue dormance. L'emploi d'inhibiteurs de germination n'est nécessaire que pour la fin de campagne.