




TRADITIONAL FRESH

- **Tuberi di grande calibro**
- **Buccia lucente, molto invitante**
- **Buona resa**
- **Varietà multiuso**
- **Buona resistenza al confezionamento**



Caratteristiche agronomiche

Maturazione	59	Medio-tardiva
Resa	106	Alta
Durata della dormienza	70	Lunga
Resa	107	Alta
Calibro del tubero	83	Grosso
Forma del tubero		Lunga-ovale
Numero di tuberi		9-11
Colore della pelle		Giallo-chiara
Colore pasta cottura		Giallo
Tipo di cottura		B - Quasi farinosa
Sostanza secca/Amido		20,9% / 15,1%
Contenuto de sostanza se		385 / 1,083
Inbrunimento interno	7	Qualcosa sensibile
Sens. al Metribuzin	83	● ● ● ● ●
Tuberomania	75	● ● ● ● ●



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

Densità di semina

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila	
		75 cm	90 cm
28/35	47.500	28	23
35/45	42.000	32	26
35/55	37.000	36	30
50/55	35.000	38	32
55/65	33.500	40	33

Profondità di semina: normale.

Controllare sempre il numero di tuberi per un calcolo accurato.

Resistenze

Peronospora fogliame	52	● ● ● ● ●
Peronospora del tubero	71	● ● ● ● ●
Alternaria	76	● ● ● ● ●
Scabbia comune	57	● ● ● ● ●
Scabbia pulverulenta	50	● ● ● ● ●
Macchie intern.nematodi	55	● ● ● ● ●
PVY	12	● ● ● ● ●
Yntn tolleranza tubero	99	● ● ● ● ●

Res. a nematodi

Ro1/4 *1	● ● ● ● ●
Ro2/3 *1	● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ●
Pa2 4	● ● ● ● ●
Pa3 3	● ● ● ● ●

Res. a Rogna Nera

F1 3	● ● ● ● ●
F2 *1	● ● ● ● ●
F6 4	● ● ● ● ●
F18 3	● ● ● ● ●


* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

Concimazione

- Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno.
- Alta richiesta di azoto, specialmente durante lo sviluppo iniziale.
- L'azoto può essere somministrato in un'unica soluzione. Questo promuove la crescita della coltura.
- Azoto (N): Bisogni medi (170-210 kg N/ha inclusa la dotazione del terreno).
- Distribuire quantità di fosforo e potassio seguendo i criteri standard.
- Non usare concime organico.



TRADITIONAL FRESH




Preparazione dei tuberi e semina

- VOYAGER ha una lunga dormienza.
- Un trattamento termico è consigliato per rompere la dormienza.
- Migliori condizioni di crescita in terreni leggeri, non troppo ricchi o poveri.
- Può essere piantata quando le gemme sono aperte, ma una buona pre-germogliazione avvantaggia la coltura.
- La semina precoce è consigliata.




Coltivazione

- La tuberizzazione è tardiva.
- VOYAGER ha emergenza lenta, successivamente il fogliame si svilupperà dando origine ad una pianta robusta.
- Usare principi attivi che siano efficaci contro *Alternaria solani* e *Alternaria alternata*.
- Nonostante la buona resistenza alla *Phytophthora*, un trattamento preventivo regolare è consigliato data la lunga stagione di crescita.
- VOYAGER è leggermente suscettibile alla scabbia comune.
- VOYAGER è abbastanza resistente ai nematodi.



Maturazione e raccolta

- Assicurarsi che la coltura sia matura al momento del disseccamento.



Conservazione

- VOYAGER è un po' suscettibile a *Fusarium*.
- Ventilare regolarmente, ma per tempi brevi, per evitare l'accumulo di CO₂.
- È bene conservare a temperatura costante.
- VOYAGER ha una lunga dormienza. L'inibitore della germogliazione si rende necessario solo per le spedizioni veramente tardive.