



## Anbauempfehlung Speisekartoffeln GENERAL

- Sehr robuste Sorte
- Geeignet für den zweiten (Herbst-/Winter-) Anbau
- Vielseitige Sorte
- Gut geeignet für die Langzeitlagerung



### Sorteneigenschaften

|                     |     |                        |
|---------------------|-----|------------------------|
| Reifezeit           | 56  | Mittelspät             |
| Keimruhe            | 103 | Sehr lang              |
| Ertrag              | 119 | Sehr hoch              |
| Sortierung          | 81  | Großfallend            |
| Knollenform         |     | Lang-oval              |
| Knollenzahl         |     | 9-11                   |
| Schalenfarbe        |     | Hellgelb               |
| Fleischfarbe kochen |     | Creme                  |
| Kochtyp             |     | AB - Vorw. Festkochend |
| TS/Stärke %         |     | 18% / 12,2%            |
| UWG/Spez. Gewicht   |     | 326 / 1,069            |
| Blaufleckigkeit     | 12  | Ziemlich empfindlich   |
| Metribuzin Empf.    | 65  | ● ● ● ● ●              |
| Knöllchensucht      | 88  | ● ● ● ● ●              |



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

### Pflanzabstände

| Sortierung | Knollenzahl/ha | Reihenabstand |       |
|------------|----------------|---------------|-------|
|            |                | 75 cm         | 90 cm |
| 28/35      | 45 000         | 30            | 25    |
| 35/45      | 42 000         | 32            | 26    |
| 35/55      | 40 000         | 33            | 28    |
| 50/55      | 38.000         | 35            | 29    |
| 55/65      | 36.000         | 37            | 31    |

Pflanztiefe: normal

Immer die Knollenzahl prüfen für eine genaue Berechnung.

### Resistenz

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Krautfäule           | 48 | ● ● ● ● ● |
| Knollenfäule         | 42 | ● ● ● ● ● |
| Alternaria           | 84 | ● ● ● ● ● |
| Schorf               | 65 | ● ● ● ● ● |
| Pulverschorf         | 73 | ● ● ● ● ● |
| Eisenfleckigkeit     | 83 | ● ● ● ● ● |
| Y-Virus              | 99 | ● ● ● ● ● |
| Yntn Knollentoleranz | 99 | ● ● ● ● ● |

### Nematodenresist.

|          |           |       |           |
|----------|-----------|-------|-----------|
| Ro1/4 *9 | ● ● ● ● ● | F1 *9 | ● ● ● ● ● |
| Ro2/3 *7 | ● ● ● ● ● | F2 *5 | ● ● ● ● ● |
| Ro5 *5   | ● ● ● ● ● | F6 *5 | ● ● ● ● ● |
| Pa2 *8   | ● ● ● ● ● | F18   | ● ● ● ● ● |
| Pa3 *5   | ● ● ● ● ● |       |           |

\* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

### Düngung

- Der Nährstoffbedarf basiert auf den Bodenprobenergebnissen.
- Beachten Sie immer die örtlichen und aktuellen Regelungen zur Pflanzendüngung.
- Kalium (K): ca. 250 kg K/ha vor dem Pflanzen. Bei Böden mit niedrigem Kaliumgehalt nach der Knollenbildung zusätzlich 100 kg K/ha ausbringen.
- Phosphat (P): ca. 90-100 kg K/ha vor dem Pflanzen.
- Calcium und Bordünger verwenden für eine bessere Lagerung.



## Anbauempfehlung Speisekartoffeln GENERAL



### Vorbereitung und Pflanzung

- ZELDA hat eine lange Keimruhe.
- Vorkeimen trägt zur Ernteverfrühung bei.
- Eventuell vorhandene Apikalkeime entfernen. Pflanzen mit kleinen weißen Punkten in den Augen.
- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen erwärmen und leicht gekeimt pflanzen.
- ZELDA Pflanzgut immer gegen Rhizoctonia behandeln.




### Anbau

- ZELDA ist empfindlich gegen Metribuzin, nur im Voraufbau anwenden.
- Der Boden gut feucht halten für einen guten Ertrag und eine gute Qualität.
- Die Krautfäulebehandlungen regelmäßig durchführen, um Kraut- und Knollenfäule vorzubeugen.



### Krautregulierung und Ernte

- Ein abgereifter Bestand bringt ein Produkt mit guter Lagerfähigkeit.
- Nur unter optimalen Bedingungen ernten.



### Lagerung

- ZELDA hat eine lange Keimruhe und eine gute Lagerfähigkeit.
- Lagertemperatur: 5 °C.
- ZELDA hat eine lange Keimruhe. Ein Keimhemmungsmittel ist nur für spätere Liefertermine nötig.