



Producción de consumo GENERAL

- Piel brillante muy atractiva
- Apropiada como patata de verdete
- Variedad multifuncional
- Apropiada para almacenamientos largos



Propiedades agronómicas

Maduración	56	Semi- tardia
Período de dormencia	103	Muy largo
Producción	119	Muy alta
Tamaño del tuberculo	81	Calibre grande
Forma		Oval-alargada
Número de tubérculos		9-11
Color de piel		Amarilla clara
Color carne cocinar		Crema
Tipo de cocion		AB - Ligeramente firme
Materia seca/Almidon %		18% / 12,2%
/Peso específico		326 / 1,069
Golpeo interno	12	Bastante sensible
Sens. Metribuzin	65	● ● ● ● ●
Fenómeno patatitas	88	● ● ● ● ●



Color de piel y carne



Tipo de cocion



Maduración

Densidad de plantación

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	42.000	32	26
35/55	40.000	33	28
50/55	38.000	35	29
55/65	36.000	37	31

Profundidad de plantación: normal.

Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.

Resistencias

Mildíu en planta	48	● ● ● ● ●
Mildíu en el tubérculo	42	● ● ● ● ●
Alternaria	84	● ● ● ● ●
Sarna común	65	● ● ● ● ●
Sarna verrugosa	73	● ● ● ● ●
Spraing	83	● ● ● ● ●
Virus Y	99	● ● ● ● ●
Tol. Yntn tubérculo	99	● ● ● ● ●

Res. a nemátodos		Roña	
Ro1/4 *9	● ● ● ● ●	F1 *9	● ● ● ● ●
Ro2/3 *7	● ● ● ● ●	F2 *5	● ● ● ● ●
Ro5 *5	● ● ● ● ●	F6 *5	● ● ● ● ●
Pa2 *8	● ● ● ● ●	F18	● ● ● ● ●
Pa3 *5	● ● ● ● ●		

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Consulte siempre las normas locales vigentes sobre fertilización de cultivos.
- Potasio (K): aproximadamente 250 kg de K/ha antes de la plantación. En suelos con niveles bajos de potasio hay que hacer una aportación adicional de 100 kg.
- Fosfato (P): aproximadamente 90-100 kg de K/ha antes de la plantación.
- Añadir Calcio y Boro en la fertilización para obtener unos mejores resultados en almacenaje.



Producción de consumo GENERAL



Cultivo

- ZELDA tiene una dormencia larga.
- La prebrotación ayuda a acelerar el crecimiento.
- Si el brote apical está presente, hay que quitarlo y plantar con pequeñas yemas blanquecinas.
- Dejar calentar la semilla correctamente y plantar con pequeños brotes blancos.
- Tratar siempre la semilla de ZELDA contra rizoctonia.




Período de cultivo

- ZELDA es muy sensible a metribuzin, usarlo solo en preemergencia.
- Mantener una humedad adecuada del terreno para una buena cosecha y calidad.
- Utilizar un programa estricto para la protección contra Phytophthora, debido a la susceptibilidad en la planta.



Destrucción de las plantas

- Solo una cosecha con correcta maduración proporcionará un producto apto para un buen almacenamiento.
- Mínimo dos semanas entre el quemado y la recogida para un correcto fijado de la piel.
- Recoger solo cuando las condiciones del suelo son las adecuadas.



Almacenamiento

- ZELDA tiene una dormencia larga y un buen almacenamiento.
- Temperatura de almacenamiento: 5 °C.
- ZELDA tiene una dormencia larga. Los inhibidores de brotación solo se necesitan para entregas tardías.