



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation GENERAL

- Peau très brillante et attractive
- Peut être utilisée en deuxième culture (automne/hiver)
- Variété polyvalente
- Bonne aptitude à une longue conservation



Caractéristiques agronomiques

Maturité	56	Demi-tardive
Période de dormance	103	Très longue
Rendement à maturité	119	Très élevé
Calibre	81	Gros
Forme		Oblong allongé
Nombre de tubercules		9-11
Couleur de peau		Jaune clair
Chair après cuisson		Crème
Type de cuisson		AB - Assez ferme
Matière sèche/Amidon %		18% / 12,2%
Poids sous l'eau/		326 / 1,069
Noircissement interne	12	Moyennement sensible
Sens. à la Métribuzine	65	● ● ● ● ●
Boulage	88	● ● ● ● ●



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

Densité du peuplement

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs	
		75 cm	90 cm
28/35	45 000	30	25
35/45	42 000	32	26
35/55	40 000	33	28
50/55	38.000	35	29
55/65	36.000	37	31

Profondeur de plantation: normale.

Toujours vérifier le nombre de tubercules/kg pour une densité de plantation plus précise.

Résistances

Mildiou du feuillage	48	● ● ● ● ●
Mildiou du tubercule	42	● ● ● ● ●
Alternaria	84	● ● ● ● ●
Gale commune	65	● ● ● ● ●
Gale poudreuse	73	● ● ● ● ●
Virus rattle du tabac	83	● ● ● ● ●
Virus Y	99	● ● ● ● ●
Yntn virus sur tubercule	99	● ● ● ● ●

Nématodes

Ro1/4 *9	● ● ● ● ●
Ro2/3 *7	● ● ● ● ●
Ro5 *5	● ● ● ● ●
Pa2 *8	● ● ● ● ●
Pa3 *5	● ● ● ● ●

Galle Verruqueuse

F1 *9	● ● ● ● ●
F2 *5	● ● ● ● ●
F6 *5	● ● ● ● ●
F18	● ● ● ● ●


* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

Fertilisation

- Adapter la fertilisation selon l'analyse de sol.
- Toujours se référer aux conditions légales en vigueur dans votre région.
- Potassium (K): environ 250 kg K/ha avant plantation. Dans les sols pauvres en potassium, apporter en complément 100 kg/ha après la tubérisation.
- Engrais phosphaté (P): environ 90-100 kg P/ha avant plantation.
- Pour une meilleure conservation, inclure du calcium et du bore dans la fertilisation.



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation GENERAL




Plantation

- ZELDA présente une longue dormance.
- La prégermination favorise la croissance de la plante.
- Si un germe apical est présent, il faut le retirer et planter des plants au stade point blanc.
- Stocker le plant pour l'arrière-saison à 8 degrés.
- Bien réchauffer les plants. Planter au stade point blanc.
-
- Toujours traiter les plants de ZELDA contre le rhizoctone.




Culture

- ZELDA est assez sensible à la métribuzine, traiter uniquement en pré-levée.
- Maintenir une bonne humidité du sol pour assurer rendement et qualité.
- Utiliser un programme efficace pour prévenir le mildiou du feuillage.



Défanage et Récolte

- Seule une culture arrivée à maturité donnera un produit stockable.
- Respecter un délai défanage - récolte de 2 semaines minimum.
- Récolter uniquement quand les conditions optimales sont réunies.



Conservation

- ZELDA a une longue dormance et une bonne aptitude à la conservation.
- Température de stockage : 5 °C.
- ZELDA a une longue dormance. L'emploi d'inhibiteurs de germination n'est nécessaire que pour la fin de campagne.