



GENERAL

- **Buccia lucente, molto invitante**
- **Idonea per la produzione bisestile**
- **Varietà multiuso**
- **Idonea per una lunga conservazione**



Caratteristiche agronomiche

Maturazione	56	Medio-tardiva
Durata della dormienza	103	Molto lunga
Resa	119	Molto alta
Calibro del tubero	81	Grosso
Forma del tubero		Lunga-ovale
Numero di tuberi		9-11
Colore della pelle		Giallo-chiara
Colore pasta cottura		Crema
Tipo di cottura		AB - Quasi Soda
Sostanza secca/Amido		18% / 12,2%
Contenuto de sostanza se		326 / 1,069
Inbrunimento interno	12	Moderatamente sensibile
Sens. al Metribuzin	65	● ● ● ● ●
Tuberomania	88	● ● ● ● ●



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

Densità di semina

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	42.000	32	26
35/55	40.000	33	28
50/55	38.000	35	29
55/65	36.000	37	31

Profondità di semina: normale.

Controllare sempre il numero di tuberi per un calcolo accurato.

Resistenze

Peronospora fogliame	48	● ● ● ● ●
Peronospora del tubero	42	● ● ● ● ●
Alternaria	84	● ● ● ● ●
Scabbia comune	65	● ● ● ● ●
Scabbia polverulenta	73	● ● ● ● ●
Macchie intern.nematodi	83	● ● ● ● ●
PVY	99	● ● ● ● ●
Yntn tolleranza tubero	99	● ● ● ● ●

Res. a nematodi	
Ro1/4 *9	● ● ● ● ●
Ro2/3 *7	● ● ● ● ●
Ro5 *5	● ● ● ● ●
Pa2 *8	● ● ● ● ●
Pa3 *5	● ● ● ● ●

Res. a Rogna Nera	
F1 *9	● ● ● ● ●
F2 *5	● ● ● ● ●
F6 *5	● ● ● ● ●
F18	● ● ● ● ●


* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

Concimazione

- Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno.
- Fare sempre riferimento alle norme locali vigenti in materia di fertilizzazione delle colture.
-
-
- Potassio (K): circa 200 kg K/ha prima della semina. Nei terreni con scarsa dotazione di potassio, somministrare 100 unità dopo la tuberizzazione.
- Fosfato (P): circa 90-100 kg K/ha prima della semina.
- Al fine di ottenere una migliore conservazione dei tuberi, è consigliata la somministrazione di Calcio e Boro con la concimazione.



GENERAL




Preparazione dei tuberi e semina

- ZELDA ha una lunga dormienza.
- La pre-germinazione contribuisce ad anticipare la crescita.
- Se è presente un germoglio apicale, rimuoverlo e piantare quando compaiono piccoli germoglietti bianchi.
- Bene riscaldare il seme. Seminare con un piccolo germoglio bianco.
- Trattare sempre il seme contro la Rhizoctonia.




Coltivazione

- ZELDA è abbastanza sensibile al metribuzin, usarlo solo in pre-emergenza.
- Mantenere un adeguato livello di umidità del suolo per ottenere un prodotto di qualità.
- Attuare un'accurata protezione contro la Phytophthora, per prevenire danni al fogliame.



Maturazione e raccolta

- Solo un raccolto maturo darà un buon prodotto conservabile.
- In caso di disseccamento del fogliame, attendere almeno due settimane prima della raccolta.
- Effettuare la raccolta solo quando le condizioni del suolo sono ottimali.



Conservazione

- ZELDA ha una lunga dormienza e buona conservabilità.
- Temperatura di conservazione: 5 °C.
- ZELDA ha una lunga dormienza. L'inibitore della germogliazione si rende necessario solo per le spedizioni veramente tardive.