



Produção de batata de consumo GENERAL

- **Pele bastante atrativa e brilhante**
- **Apropriada para segunda cultura**
- **Variedade polivalente**
- **Adequada para uma armazenagem de longa duração**



Propriedades agronômicas

Maturação	56	Semi tardia
Período de dormência	103	Muito Longo
Produto final maturação	119	Muito alto
Tamanho tubérculos	81	Grande calibre
Forma dos tubérculos		Alongada-oval
Numero de tubérculos		9-11
Cor da pele		Amarela clara
Polpa após cozinhar		Creme
Tipo culinário		AB - Moderadamente firm
Peso de matéria seca/Aln		18% / 12,2%
Teor de matéria seca/Pes		326 / 1,069
Enegrecimento interno	12	Moderado sensível
Sens. ao Metribuzin	65	● ● ● ● ●
Formacao de Batatinhas	88	● ● ● ● ●



Cor da pele e carne



Tipo culinário



Maturação

Densidade de Plantação

Calibre	Densidade de plantação/ha	Distancia entre linhas	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	42.000	32	26
35/55	40.000	33	28
50/55	38.000	35	29
55/65	36.000	37	31

Profundidade de plantação: normal.

Verificar sempre a contagem de tubérculos para um cálculo correto.

Resistências

Mildio da folha	48	● ● ● ● ●
Mildio do tuberculo	42	● ● ● ● ●
Alternaria	84	● ● ● ● ●
Sarna comum	65	● ● ● ● ●
Sarna pulvulenta	73	● ● ● ● ●
Spraing	83	● ● ● ● ●
PVY	99	● ● ● ● ●
Yntn tolerancia tubérculos	99	● ● ● ● ●

Res. aos nematodos

Ro1/4	*9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*7	● ● ● ● ●
Ro5	*5	● ● ● ● ●
Pa2	*8	● ● ● ● ●
Pa3	*5	● ● ● ● ●

Res. verruga

F1	*9	● ● ● ● ●
F2	*5	● ● ● ● ●
F6	*5	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

* HZPC own analysis/no official analysis

Fertilização

- Adaptar a fertilização em função das análises do solo.
- Consulte sempre as regras locais atuais sobre a fertilização das culturas.
-
-
- Potássio (K): aprox. 250 kg K/ha antes da plantação. Em solos com baixos níveis de Potássio, é necessária uma aplicação adicional de 100 kg após a tuberação.
- Fósforo (P): aprox. 90-100 kg K/ha antes da plantação.
- Inclua cálcio e boro na mistura de fertilizantes para um melhor desempenho de armazenamento.



Produção de batata de consumo **GENERAL**



Preparação e Plantação

- ZELDA tem uma dormência longa.
- O pré-abrolhamento ajuda a promover o crescimento.
- Se tiver um broto apical, retirar e plantar com pequenos brotos brancos.
- Aquecer corretamente a semente e plantar com pequenos grelos brancos.
- Tratar sempre as sementes de ZELDA e o solo contra Rhizoctonia.




Cultivo

- ZELDA é muito sensível à Metribuzina, aplicar apenas em pré-emergência.
- Mantenha a umidade adequada do solo para um bom rendimento e qualidade.
- Utilizar um plano de tratamentos, devido ao elevado risco do Míldio da folha.



Defenagem e Colheita

- Apenas uma cultura com o ciclo completo garante boas condições para armazenamento.
- Mínimo de 2 semanas entre a dessecagem das plantas e o arranque para ter uma pele completamente firme.
- Proceda ao arranque quando as condições do solo forem ótimas.



Armazenamento

- ZELDA tem uma boa dormência e boa capacidade de armazenamento.
- Temperatura de armazenamento: 5 °C.
- ZELDA tem uma dormência longa. O anti-abrolhante só é necessário armazenamentos a longo prazo.